



Preguntas frecuentes

Descripción general del producto

¿Qué es Gvoke HypoPen?

Gvoke HypoPen es el primer autoinyector de glucagón para emergencias de niveles bajos de azúcar en sangre para personas con diabetes, de 2 años de edad o más.¹ Está premezclado y listo para usar.¹ Cualquier persona puede usar Gvoke HypoPen con 2 sencillos pasos.² Se encuentra disponible en 2 dosis (una para niños y otra para adultos) y no requiere refrigeración.

¿Quiénes corren riesgo de tener nivel bajo grave de azúcar en sangre?

Hay muchas razones por las que las personas pueden correr riesgo de tener un nivel bajo grave de azúcar en sangre. Puede correr más riesgo si toma insulina o sulfonilurea para ayudarlo a controlar su diabetes, hace ejercicio a un nivel intenso, suele saltarse las comidas, tiene un horario inconsistente, está estresado, tiene metas estrictas de azúcar en sangre, tiende a tener problemas con la bomba de insulina, es más sensible a la insulina, ha tenido niveles bajos de azúcar en sangre en el pasado, tiene dificultades para reconocer los signos de niveles bajos de azúcar en sangre, ha tenido diabetes durante mucho tiempo o tiene problemas para tomar sus medicamentos.³⁻⁵

¿Cuándo debo usar Gvoke®?

Gvoke se puede utilizar para tratar un evento grave de nivel bajo de azúcar en sangre si las personas se encuentran en las siguientes circunstancias¹:

1. Han tratado la situación con alimentos y bebidas en numerosas ocasiones y no hubo mejoría.
2. No pueden tragar de forma segura.
3. Sienten que podrían desmayarse.
4. Tienen pérdida del conocimiento o convulsiones.

Es importante recordar que Gvoke se puede usar incluso antes de que usted o la persona a la que está ayudando se desmayen o tengan una crisis. Es bueno que usted y las personas que forman parte de su vida sepan cómo usarlo antes de que lo necesiten.

¿Existe algún efecto secundario con Gvoke?

Los efectos secundarios más frecuentes en adultos fueron náuseas (30 %), vómitos (16 %) y dolor de cabeza (5 %).¹ Los efectos secundarios más frecuentes en niños fueron náuseas (45 %), hipoglucemia (39 %), vómitos (19 %), dolor de cabeza (7 %), dolor abdominal (3 %), hiperglucemia (7 %), molestias en el lugar de la inyección (3 %), reacción en el lugar de la inyección (3 %) y urticaria (3 %).¹ La mayoría de los efectos secundarios fueron leves. Si un adulto terminaba teniendo un efecto secundario, el 81 % de las veces fue leve. Si un niño terminaba teniendo un efecto secundario, el 83 % de las veces fue leve.⁶

¿En qué se diferencia Gvoke de un kit de glucagón tradicional?

Gvoke está premezclado y listo para usar. También está disponible como dosis para niños de 0,5 mg/0,1 ml y dosis de 1 mg/0,2 ml para adultos.¹

[Continúa en la página siguiente](#)

¿Cuál es la diferencia entre la jeringa precargada Gvoke[®] y Gvoke HypoPen?

Tanto la jeringa precargada Gvoke como Gvoke HypoPen son para el tratamiento de emergencias del nivel bajo de azúcar en sangre en personas con diabetes, de 2 años de edad o más.¹ Ambos están premezclados y listos para usar.¹ Uno se presenta como una jeringa precargada con una aguja visible de media pulgada,² y el otro se presenta como un autoinyector sin aguja visible. Ambas opciones se pueden utilizar en 2 sencillos pasos.^{2,7}

Uso del producto

¿Cómo se usa Gvoke HypoPen?²



1
Retire la tapa roja.



2
Presione el extremo amarillo en la parte superior del brazo, en la parte inferior del abdomen o en la parte externa del muslo; espere 5 segundos hasta que la ventana se ponga roja.

Después de usar Gvoke, debe ponerse de pie o colocarse de costado y llamar a emergencias para pedir ayuda.

¿Se puede inyectar Gvoke a través de la ropa?

No, Gvoke solo debe inyectarse directamente sobre la piel expuesta y puede inyectarse en la parte superior del brazo, la parte inferior del abdomen o la parte externa del muslo.²

¿Por qué debo llamar para obtener ayuda médica de emergencia después de usar Gvoke?

Se recomienda que cualquier persona que sufra un episodio de hipoglucemia grave busque ayuda posteriormente para comprobar los niveles de glucosa adecuados y planificar los ajustes futuros del tratamiento.¹

Opciones de administración de dosis

¿Existe una dosis de Gvoke disponible específicamente para niños?

Sí, hay una dosis específica para niños. Gvoke se encuentra disponible en una dosis de 0,5 mg/0,1 ml para niños <12 años. Para niños menores de 12 años que pesen ≥ 100 libras, se recomienda una dosis de 1 mg/0,2 ml.¹

Hable con su médico sobre qué dosis es adecuada para su hijo.

¿Qué dosis están disponibles para adolescentes y adultos?

Gvoke se encuentra disponible en una dosis de 1 mg/0,2 ml para pacientes adolescentes y adultos ≥ 12 años de edad.¹



Almacenamiento y manipulación

¿Cómo debo conservar Gvoke®?

Gvoke debe conservarse en la bolsa de aluminio original hasta el momento de su uso y debe conservarse a temperatura ambiente: de 20 °C a 25 °C (de 68 °F a 77 °F). Gvoke no debe refrigerarse ni congelarse.¹

¿Cuál es la vida útil de Gvoke?

Gvoke puede almacenarse en el envase original durante un máximo de 2 años a partir de la fecha de fabricación. Debe comprobar siempre la fecha de vencimiento en la etiqueta para asegurarse de que Gvoke no haya vencido.⁶

¿Puedo conservar Gvoke en el refrigerador?

No, Gvoke no debe refrigerarse ni congelarse. Gvoke debe almacenarse a temperatura ambiente.¹

¿Puedo seguir usando Gvoke si lo extraigo de la bolsa, pero no lo utilizo inmediatamente?

Gvoke debe mantenerse en la bolsa de aluminio original sellada para protegerlo de la luz y la humedad hasta el momento de su uso.² Si se retira de la bolsa de aluminio y no se usa inmediatamente como se indica, comuníquese con su médico para obtener una nueva prescripción de Gvoke. Deseche adecuadamente Gvoke abierto en un recipiente para objetos punzantes después de que llegue el repuesto.²

¿Cómo se debe descartar Gvoke?

Después de usarlo, Gvoke debe mantenerse en un lugar seguro hasta que pueda desecharse en un recipiente para objetos punzantes aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos.²

Costo y acceso

¿Puede Xeris ayudarme con el costo de Gvoke?

Si tiene seguro comercial, puede ser elegible para recibir asistencia financiera con la tarjeta de copago de Gvoke.*

Xeris también ofrece un Programa de Asistencia al Paciente para ayudar a los pacientes que reúnan los requisitos y que no pueden pagar sus medicamentos a obtener Gvoke sin costo alguno. Llame al 1-877 (1-877-694-8653) para obtener más información.

*Pueden aplicarse términos y condiciones. Visite GvokeGlucagon.com/Savings-and-Support para obtener más información.

¿Cómo puedo obtener Gvoke?

Gvoke está disponible con receta en su farmacia local y mediante entrega a domicilio. Si está interesado en la entrega a domicilio, puede realizar un pedido en GvokeGlucagon.com/Ordering-Gvoke.

INDICACIÓN E INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

INDICACIONES Y RESUMEN DE SEGURIDAD

GVOKE es un medicamento recetado que se usa para tratar los niveles muy bajos de azúcar en sangre (hipoglucemia grave) en adultos y niños de 2 años o más con diabetes. Se desconoce si GVOKE es seguro y eficaz en niños menores de 2 años.

ADVERTENCIAS

No use GVOKE en los siguientes casos:

- Tiene un tumor en la glándula que se encuentra en la parte superior de los riñones (glándula suprarrenal), denominado feocromocitoma.
- Tiene un tumor en el páncreas, denominado insulinoma.
- Es alérgico al glucagón o a cualquier otro ingrediente inactivo de GVOKE.

GVOKE PUEDE PROVOCAR EFECTOS SECUNDARIOS GRAVES, QUE INCLUYEN LOS SIGUIENTES:

Hipertensión arterial. GVOKE puede causar hipertensión arterial en ciertas personas con tumores en las glándulas suprarrenales.

Nivel bajo de azúcar en sangre. GVOKE puede provocar niveles bajos de azúcar en sangre en ciertas personas con tumores en el páncreas denominados insulinomas al producir demasiada insulina en el organismo.

Reacción alérgica grave. Llame a su médico o **busque ayuda médica de inmediato** si tiene una reacción alérgica grave que incluya lo siguiente:

- Erupción
- Dificultad para respirar
- Hipotensión arterial

EFECTOS SECUNDARIOS FRECUENTES

Los efectos secundarios más frecuentes de GVOKE en adultos incluyen los siguientes:

- Náuseas
- Vómitos
- Hinchazón en el lugar de la inyección
- Dolor de cabeza

Los efectos secundarios más frecuentes de GVOKE en niños incluyen los siguientes:

- Náuseas
- Nivel bajo de azúcar en sangre
- Hiperglucemia
- Vómitos
- Dolor abdominal
- Dolor de cabeza
- Dolor o enrojecimiento en el lugar de la inyección
- Picazón

Estos no son todos los efectos secundarios posibles de GVOKE. Para obtener más información, consulte a su médico. Llame a su médico para obtener asesoramiento médico sobre los efectos secundarios. **Se le recomienda informar los efectos secundarios de fármacos recetados a la Administración de Alimentos y Medicamentos. Visite www.fda.gov/medwatch o llame al 1-800-FDA-1088.**

Consulte la [Información de prescripción completa](#) para Gvoke.

REFERENCIAS: 1. Gvoke [información de prescripción]. Chicago, IL: Xeris Pharmaceuticals, Inc. 2. Gvoke HypoPen [instrucciones de uso]. Chicago, IL: Xeris Pharmaceuticals, Inc. 3. National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases. Low blood glucose (hypoglycemia). 2021. <https://www.niddk.nih.gov/health-information/diabetes/overview/preventing-problems/low-blood-glucose-hypoglycemia>. Consultado el 22 de septiembre de 2021. 4. Kedia N. Treatment of severe diabetic hypoglycemia with glucagon: an underutilized therapeutic approach. Diabetes Metab Syndr Obes. 2011;4:337-346. 5. Geller AJ, Shehab N, Lovegrove MC, et al. National estimates of insulin-related hypoglycemia and errors leading to emergency department visits and hospitalizations. JAMA Intern Med. 2014;174(5):678-686. 6. Datos en archivo. Chicago, IL: Xeris Pharmaceuticals, Inc. 7. Jeringa precargada Gvoke [instrucciones de uso]. Chicago, IL: Xeris Pharmaceuticals, Inc.

ANTES DE USAR

Antes de usar GVOKE, informe a su médico acerca de todas sus afecciones médicas, incluso en los siguientes casos:

- Tiene problemas de glándulas suprarrenales.
- Tiene un tumor en el páncreas.
- No ha recibido alimentos ni agua durante un largo tiempo (ayuno prolongado o inanición nutricional).
- Tiene un nivel bajo de azúcar en sangre que no desaparece (hipoglucemia crónica).
- Está embarazada o planea quedarse embarazada.
- Está en período de lactancia o planea amamantar.

Informe a su médico acerca de todos los medicamentos que toma, incluidos los medicamentos recetados y de venta libre, las vitaminas y los suplementos a base de hierbas.

CÓMO USARLO

- Lea las instrucciones de uso detalladas que se adjuntan al medicamento GVOKE.
- Usar GVOKE exactamente como le indique su proveedor de atención médica.
- Asegúrese de que sus familiares, amigos cercanos y cuidadores sepan dónde almacena GVOKE y cómo usarlo de la forma correcta antes de que necesite su ayuda.
- Actúe con rapidez. Tener un nivel muy bajo de azúcar en sangre durante un período de tiempo puede ser perjudicial.
- Su proveedor de atención médica le dirá cómo y cuándo usar GVOKE.
- Después de administrar GVOKE, el cuidador debe llamar para obtener ayuda médica de emergencia de inmediato.
- Si no responde después de 15 minutos, su cuidador puede darle otra dosis, si está disponible. Informe a su médico cada vez que utilice GVOKE. El nivel bajo de azúcar en sangre puede ocurrir de nuevo después de recibir una inyección de GVOKE. Puede que sea necesario cambiar su medicamento para la diabetes.

CÓMO GUARDAR

- Mantenga GVOKE en la bolsa de aluminio hasta que esté listo para usarlo.
- Guarde GVOKE a temperaturas entre 68 °F y 77 °F.
- **No lo mantenga en el refrigerador ni lo deje congelar.**

Mantenga GVOKE y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.

Para obtener más información, llame al 1-877-937-4737 o visite www.GvokeGlucagon.com.

